

		Exposition	Port	Hauteur maximale	Largeur maximale	Feuillage	Floraison	Couleur des fleurs	Fructification	Fruit	Intérêt pour la faune locale	Propriétés
Grand développement > 20 m	<b>Tilleul à petites feuilles</b> <i>Tilia cordata</i>			25 m	15 m	<b>Caduc</b> abondant, vert foncé luisant virant au jaune à l'automne	Mai	Vert	Septembre octobre	Fruit sec marron		
	<b>Chêne pubescent</b> <i>Quercus pubescens</i>			25 m	10 m	<b>Marescent</b> (qui garde ses feuilles mortes l'hiver), vert foncé, virant au jaune puis au brun à l'automne	Avril-mai	Chatons verts	Septembre	Gland marron		
	<b>Chêne sessile</b> <i>Quercus petraea</i>			25 m	15 m	<b>Caduc</b> , vert clair virant au jaune puis brun à l'automne	Avril-mai	Chatons verts	Septembre	Gland marron		
	<b>Micocoulier de Provence</b> <i>Celtis australis</i>			25 m	10 m	<b>Caduc</b> , vert vif en été et prennent souvent des teintes jaunes à oranges à l'automne	Avril	Verdâtre	Septembre octobre	Druppe rouge foncé à noir		
Développement moyen de 10 m à 20 m	<b>Merisier</b> <i>Prunus avium</i>			20 m	10 m	<b>Caduc</b> , feuilles ovales vert foncé virant au rouge à l'automne	Mars-mai	Blanc	Juillet-août	"merise" : petite cerise rouge		
	<b>Erable champêtre</b> <i>Acer campestre</i>			15 m	5 m	<b>Caduc</b> , petites feuilles virant au jaune à l'automne	Mai	Vert	Septembre	Samare vert rougeâtre		
	<b>Erable à feuilles d'Obier</b> <i>Acer opalus</i>			15-20 m	8-10 m	<b>Caduc</b> , grandes feuilles légèrement orangé à pourpre à l'automne	Avril-mai	Vert	Septembre	Samare vert		
	<b>Aliser blanc</b> <i>Sorbus aria</i>			15 m	8 m	<b>Caduc</b> , feuilles à revers argenté, virant au jaune ornage à l'automne	Mai	Blanc	Septembre	Alise rouge		
	<b>Aliser torminal</b> <i>Sorbus torminalis</i>			15 m	8 m	<b>Caduc</b> , feuilles vert brillant, prenant une couleur jaune orange à l'automne	Mai	Blanc	Septembre octobre	Alise rouge marron		
	<b>Cormier</b> <i>Sorbus domestica</i>			15-20 m	8 m	<b>Caduc</b> , feuilles composées prenant une teinte rouge orangé à l'automne	Avril-juin	Blanc	Octobre	"corme" fruit en forme de petite poire, vert puis jaune tacheté de pourpre		
Faible développement < 10 m	<b>Aubépine monogyne</b> <i>Crataegus monogyna</i>			10 m	8 m	<b>Caduc</b> , feuilles vert foncé virant au rouge à l'automne	Avril-juin	Blanc	Août-octobre	Baie rouge		
	<b>Cerisier de Sainte-Lucie</b> <i>Prunus mahaleb</i>			10 m	8 m	<b>Caduc</b> , petites feuilles vert foncé, brillantes et ovales	Avril-mai	Blanc	Juillet-août	Petit fruit rouge à noir		
	<b>Erable de Montpellier</b> <i>Acer monspessulanum</i>			10 m	5 m	<b>Caduc</b> , petit feuillage virant au jaune à l'automne	Avril	Vert	Septembre	Samare vert devenant rouge		

**Exposition**  
   
Mi-ombre / Soleil

**Physionomie**  
   
Ovale / Etalé / Arrondi

**Espèce mellifère**  
   
Mellifère / Très mellifère

**Intérêt faune**  
   
Nourriture oiseaux / mammifères / hôte papillons

**Autres propriétés**  
   
Plante médicinale / Fruits comestibles / Fleurs odorantes / Très odorantes

## Essences fruitières pour les papilles et les yeux.

Les variétés de chaque espèce dépendront des stocks disponibles en pépinière

	Exposition	Port	Hauteur maximale	Largeur maximale	Feuillage	Floraison	Couleur des fleurs	Parfum	Récolte des fruits (selon variété)	Remarques
<b>Abricotier</b> <i>Prunus armeniaca</i>			5 m	5 m	<b>Caduc</b>	Mars-avril	Blanche rosée, très parfumée		Juillet-août	Essence plus fragile demandant un soin plus important et un sol bien drainant
<b>Amandier</b> <i>Prunus dulcis</i>			8 m	8 m	<b>Caduc</b>	Mars	Blanche ou rose, très parfumée		Août/Septembre	Essence plus fragile demandant un soin plus important et une bonne exposition au soleil
<b>Cerisier</b> <i>Prunus avium</i>			10 m	8 m	<b>Caduc</b>	Variable selon variété	Blanche		Mai-juillet	
<b>Cognassier</b> <i>Cydonia oblonga</i>			4-8 m	3-5 m	<b>Caduc</b>	Février-avril	Blanc ou rose		Septembre-novembre	Fruit à consommer blette
<b>Néflier commun</b> <i>Mespilus germanica</i>			6 m	8 m	<b>Caduc</b>	Mai	Blanche		Octobre	Fruit à consommer blette
<b>Plaqueminier (kaki)</b> <i>Diospyros kaki</i>			15 m	6-10 m	<b>Caduc</b>	Mai-juin	Blanche, jaune, verte		Octobre-décembre	
<b>Poirier</b> <i>Pyrus communis</i>			10 m	8 m	<b>Caduc</b>	Avril	Blanche		Juillet-novembre	
<b>Pommier</b> <i>Malus domestica</i>			15 m	6 m	<b>Caduc</b>	Février-avril	Blanche, parfum léger		Juillet-novembre	
<b>Prunier</b> <i>Prunus domestica</i>			8 m	4 m	<b>Caduc</b>	Mars-avril	Blanche		Juin-septembre	

### Exposition



Mi-ombre / Soleil

### Physionomie



Elancé / Etalé / Fastigié

### Parfum



Parfum léger / Très parfumé